

II. Hegyvidéki erdők

1. Savanyú talajú, acidofil erdők (l. fentebb).
 - a) Gyertyános tölgyesek.
Mészkerülő gyertyános-tölgyes (Luzulo-Quercus-Carpinetum)
 - b) Elegyetlen tölgyesek.
Mészkerülő tölgyes (Luzulo-Quercetum).
2. Semleges-bázikus talajú, bazofil erdők (l. fentebb).
 - a) Gyertyánelegyes tölgyesek
Gyertyános kocsánytalan tölgyes (l. fentebb).
 - b) Elegyetlen tölgyesek.
 - aa) Cseres kocsánytalan tölgyesek, semleges (-kissé savanyú), mélyebb talajon.
Cseres tölgyes (Quercetum petraeae-cerris).
 - bb) Molyhos (-kocsánytalan, -cseres) tölgyesek, bázikus, sekélyebb talajon.
 - α) Mészkö vagy dolomit kőzetén.
 - αα) Mannakőris hiányzik vagy ritka, cser kevés.
Molyhos-kocsánytalan tölgyes (Corno-Quercetum pubescenti-cerris vagy Q. pubescenti-petraeae)
 - ββ) Mannakőris és cser gyakori.
Molyhos-cseres tölgyes (Orno-Quercetum p.-c. vagy Q. pubescenti-cerris)
Dunántúli K.
 - β) Andezit (vagy más vulkáni) kőzetén, jellemző a magyar perje (*Poa pannonica*).
Andezit molyhos tölgyes (Poa pannonicae-Quercetum).



Egy láncszem az erdőgazda és a vadtenyésztő érdekközösségében

„A sárvári erdők története” című tanulmányban (Erdészeti Kutatások 1959. VI. évfolyam 1—2. száma) a szerző reflektorfényvel világítja meg a gyertyán hatalmas erdőművelési, termőhely-átalakító jelentőségét. Az a nagy jelentőségű, hatalmas és gazdasági kihatásaiban nehezen felmérhető program, amit az Államerdőszet vezető-sege számunkra kitűzött, az idézett tanulmányban foglaltak gondos tanulmányozása, megszívlelése és a gyertyán adta segítség felhasználása nélkül sokkal nehezebben és lassúbb ütemben lenne megvalósítható. A felújító vágások arányának növelése, a növedékserkentő gyéritések, a talaj termőerejének javítása, a legmagasabb és legértékesebb hozamot adó erdőállományok kialakítása szervesen összefüggő gazdálkodási célkitűzések. E célkitűzés eredményes megvalósításában az egyik döntő láncszem a gyertyán megfelelő elegyarányban és koronaszintben való felkarolása. Ezen feltételt megvalósítása magában foglalja helyenként a gyertyán visszaszorítását, fékentartását, de még több erdőrészletben annak elterjesztését.

Üzemvezető elődömtől egy gyertyános-akác erdőrészletet örökölttem az üzem legjobb fácános területén. Az erdőrészlet kitűnt növedékével és jó talajával. Az erdőrészlet a forgalom szempontjából exponált helyen feküdt, mégis igen kedvelt tartózkodási helye volt a fácánnak, a nyári idényben feltehetően azért, mert az erdőrészlet jó talajában bőven talált neki megfelelő rovarvilágot, míg télen biztosan azért, mert a felső szintben levő akác szabadabb koronájával bővebben termelt magot.

Az akácmag a fácán kedvenc tápláléka és egy hiányosan kezelt vadászterületen egymagában is képes a fácánállomány részbeni téli átmentésére. Igen jó gazdálkodás a bodza-cserjeszint létesítése akácosainkban, de a fejlesztési határozat célkitűzéseit, ahol ez lehetséges, a gyertyán második szint létesítése reálisabban szolgálja, véleményem szerint még cserjeszintben levő állománnyal is. Fácánállományunk kezelő erdészei gyertyános akácok létesítésével hasznos segítséget nyújthatnak a jövő érdekében dolgozó erdőművelésnek és a vadgazdaságnak.

Nagy Aladár erdőmérnök