


HAZÁNK VÉDETT FA- ÉS CSERJEFAJAI I.

Hazánkban az Alföldtől kezdve a hegyvidékig mindenütt gyakori vackoron (*Pyrus pyraeaster* BURGSD.) kívül két ritkább vadkörtefajt is találunk. E két utóbbi védelmet élvez.

Magyar vadkörte (*Pyrus magyarica* TERPÓ) 5000 Ft




Kisebbségi fa vagy cserje, tövises, kopasz hajtásokkal. Levelei szív alakúak, hegyes csúcsúak, szélük élesen szálkás-fűrészletes. Termése gömbölyded, hirtelen kocsányra futó, 1,5–2 cm nagy. A csésze a termésről lehullik, és egy világos színű gyűrű marad vissza. Hazánk bennszülött (endemikus) faja, legközelebbi rokona a Nyugat-franciaországbeli *P. cordata* DESV. Lelőhelyei a visegrádi Fekete-hegy, a pomázi Kőhegy–Ságvári menedékház és a várpalotai Burokvölgy cseres-tölgyeseiben van. Visszaszorulóban, kipusztulófélben lévő növényfajunk, melyet az 50-es évek végén *Terpó András* botanikus fedezett fel és írt le. Az egyetlen fokozott védelemben részesülő fásszárú faj. A *P. pyraeaster*-rel való állandó kereszteződés következtében utódait könnyen adszorbeálja a közönséges vadkörte. A hibrideket *P. x kárpátiana* TERPÓ névvel illetik.

3. A magyar vadkörte és a molyhos körte hazai előfordulása. A molyhos kereszt, a magyar kör

(Csapody Vera rajzai)

Molyhos körte (*Pyrus nivalis* agg. JACQ.) 2000 Ft



Levelei ékválúak, hosszúkás tojásdadok, fonákukon maradandóan molyhosak, csak a csúcs felé eső részükön fűrészletesek. Termésalakja változó, gömbös vagy körte alakú. Az Alpok keleti részén, a Kárpát-medencében és Horvátországban honos, nálunk a Visegrád–Szentenedrei-hegységben (Leányfalu, Pomáz, Szentendre), a Budai-hegységben (Hármashatárhegy, Remetehegy), a gyöngyösi Sárhegyen, a Hegyalján (Tállya, Mád) és Balatonfüred mellett bokorerdőkben, erdők szélén, egykori szőlőkben található. Számos átmeneti alakja van a *P. pyraeaster*-hez, ezeket *P. x austriaca*. A. KERNER és *P. x pannonica* TERPÓ néven foglalják össze. Az előbbi főként a Dunántúlon, az utóbbi főként az Északi-Középhegységben él.



Bartha Dénes