

Különfélék.

A későtölgy (Quercus tardissima) lombfakadásának idejére vonatkozó megfigyeléseket, melyeknek 1895. évi eredményei az „Erdészeti Lapok“ múlt évi december havi füzetében közöltettek, a kincstári erdőhatóságok és erdészeti tanintézetek a folyó évben is folytatták és pedig a következő eredménnyel:

H a t ó s á g	A kísérleti hely megnevezése	A későtölgy	Egyéb tölgyfajok	Átlagos különbség napokban
		lombfakadásának ideje az 1896. évben		
—	Erd. akadémia Selmezbányán	V. 26—VI. 6.	V. 7—V. 12.	20
M. kir. erdőgondnokság Zsarnóczan	M. kir. erdőgondnokság Garamrév	V. 20.	ápr. vége	20
M. kir. főerdőhivatal Ungvárt	M. kir. erdőgondnokság Radváncz	—	—	28
”	M. kir. erdőgondnokság Dubrinics	V. 13.	V. 1.	12
”	M. kir. erdőgondnokság Stavnán	V. 28.	—	—
M. kir. erdőhivatal Szászsebes	M. kir. erdőgondnokság Vajda-Hunyad	V. 26.	—	—
M. kir. főerdőhivatal Lippán	M. kir. erdőgondnokság Lippán	IV. 20.	IV. 29.	9
”	M. kir. erdőgondnokság Csála (Arad)	V. 1.	V. 1.	—
”	M. kir. erdőgondnokság Pécskán	V. 17.	V. 1.	16
”	M. kir. erdőgondnokság Apátfalván	V. 14.	IV. 29.	15
M. kir. erdőigazgatóság Lugos	M. kir. erdőgondnokság Kiszetón	V. 3—VI. 1. átlag V. 16.	IV. 27—V. 21. átlag V. 10.	6
—	M. kir. erdőőri szakiskola Vadászerdő (Temesvár)	IV. 30.	IV. 5.	25
—	M. kir. erdőőri szakiskola Királyhalma (Szabadka)	V. 28.	V. 1.	28

A kísérleti helyek termőhelyi viszonyát illetőleg utalok a mult évi közleményre.

Végig tekintve azokon az időközökön, melyek a későtölgy és a többi tölgyek kizöldülése között eltelnek s összehasonlítva azokat a mult évi megfigyelésekkel, általában azt tapasztaljuk, hogy ezek az időközök nagyobbodtak. Hanyatlás csak két esetben fordult elő és pedig a csálai erdőgazdaságban, a hol állítólag a többi tölgyekkel egyidejűleg fakadt a későtölgy lombja is és a kiszetői erdőgondnokságban, a hol a különbség a mult évi 16 napról 6 napra szállott alá. Ez utóbbi helyen azonban figyelembe veendő, hogy a csemetéket ez év tavaszán átültették s ennek következtében igen egyenlőtlenül zöldültek ki.

Egyes példányokat tekintve, úgy itt, mint egyáltalában valamennyi kísérleti helyen a kimutatott átlagoknál jóval nagyobb különbségek is mutatkoznak a lombfakadás idejében.

Tavaszi fagyról a radváczi és garamrévi erdőgondnokságok tettek jelentését. Mindkét helyen csak a közönséges tölgyfajok sinlették meg az éjjeli nagyfoku hősülédést, a későtölgy ellenben lombtalan állapota következtében ment maradt a megkárosodástól. (Közli: *Bund K.*)

Luczfenő csemeték betegsége czim alatt az „Erdészeti Lapok“ 1896. évi VIII. füzetének 608. hasábján megjelent kis közlemény arról ad hirt, hogy a „Vieldes Fangesi uradalmi erdőkben a nemrégiben kihasznált luczfenő vágásban a vén tuskók közelébe ültetett luczfenő csemeték pusztulásnak indulnak“ a tuskó gyökerekről átszármazó gombák miatt.

E hir nagyon meglepelt, mert Besztercze-Naszód vármegyében, főleg az Aranyos Besztercze-völgyön magam

is nagy előszeretettel ültettem a luczot pár éven keresztül tuskók mellé a lejt irányában ama kitünő védelem kedvéért, amit ezek a csemetének nyujtanak friss vágásban az árnyékolással, gyomos vágásban pedig az elnyomás ellen.

A bukovinai szaktársak — amint arról alkalman volt kerületem szomszédságában meggyőződni — a vetés több módjának gyenge eredménye után rátértek a tuskós módra, vagyis a magfészket lehetőleg tuskó alá készítik, s ezzel határozottan kedvezőbb sikert érnek el.*)

Sehol sem tapasztaltam a csemetéken a szóban forgó elbetegesedést, s gyanutlanul ajánlottam mindig alkalom adtán erdősítésnél a tuskóvédelem felhasználását.

Az idézett hír azonban kétes értékűvé teszi az általam nagyra becsült „tuskóvédelmet“, ha nem is általánosságban, de friss vágásban a „*Trametes radiciperda*“ és „*Agaricus melleus*“ dus tenyészeti ideje alatt valószínűleg.

Mindenesetre szakunk érdekében történnék, ha igen tisztelt szaktársaink, kik szerencsések e kérdéssel a helyszínen kerületökben foglalkozni, becses megfigyeléseik eredményét nyilvánosságra hoznák, hogy tisztába jöhesünk azzal: üldözzük-e vágásainkban a tuskót (lucz f.) vagy védelmi szerepénél fogva megbecsüljük felujtás alkalmával? (Közli: *Bodor Gy.*)

Halálozás. Sugár Károly nyug. m. kir. főerdész (Lippán), az Országos Erdészeti Egyesület alapító tagja meghalt. Béke poraira!

*) Utóbbi időben az ültetés ott is kezdi kiszorítani a vetést. K ö z l ő.